

# **TOUJEO<sup>®</sup>** (INSULINA GLARGINA 300 U/ML)

Toujeo<sup>®</sup> 300 u/ml SoloStar<sup>®</sup>, solución inyectable en una pluma precargada  
Toujeo<sup>®</sup> 300 u/ml DoubleStar<sup>®</sup>, solución inyectable en una pluma precargada

## **GUÍA PARA PACIENTES Y/O CUIDADORES**

- Este documento tiene como objetivo proporcionarle información que puede ayudarle en su tratamiento con Toujeo<sup>®</sup>.
- Es importante que lea el prospecto de Toujeo<sup>®</sup>, donde vienen detalladas las instrucciones de uso de esta pluma de insulina. Al prescribirle este medicamento, su profesional sanitario deberá enseñarle cómo utilizarla.
- Insulina glargina existe en el mercado con dos presentaciones distintas: Toujeo<sup>®</sup> (Insulina glargina 300U/mL) e insulina glargina 100U/mL, que no se pueden intercambiar. Es fundamental que sepa con certeza cuál es la que le ha recetado su médico para así no cometer errores durante su tratamiento.
- Empiece la administración de esta insulina con la dosis en unidades que viene escrita en su receta médica.

**Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) - Enero 2021**


## Información importante

- Toujeo® (insulina glargina 300 U/mL) e insulina glargina 100 U/mL no producen el mismo efecto en el control de sus niveles de glucosa. Es decir, no tienen la misma eficacia terapéutica puesto que **no son bioequivalentes. Por lo tanto, las plumas de estas insulinas no se puede intercambiar indistintamente sin que su médico le haga un ajuste en la dosis.**
- El cambio de un tratamiento de una insulina a otra distinta, sólo debe hacerse por prescripción de su médico y siempre se debe seguir la nueva dosis que le haya indicado.
- Usted deberá realizar un control estrecho de su glucosa en sangre durante dicho cambio y las primeras semanas tras este.
- **Insulina glargina 300 U/mL está disponible en dos presentaciones diferentes:**

**Toujeo® SoloStar®**  
(1.5 mL de bolígrafo precargado/450 U)



**Toujeo® DoubleStar®**  
(3 mL de bolígrafo precargado/900 U)



**El incremento de la dosis en Toujeo® SoloStar® es de 1 U.**

**El incremento de la dosis en Toujeo® DoubleStar® es de 2 U.**

La dosis administrada es la que se muestra en la ventana de la dosis.

Por favor, si tiene alguna duda o necesita más información, consulte a su profesional sanitario.

### **Comunicación de sospechas de efectos adversos**

Si experimenta algún tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es)

**También puede notificar estas sospechas de efectos adversos a Sanofi por teléfono en el 934859649 o por correo electrónico [es-farmacovigilancia@sanofi.com](mailto:es-farmacovigilancia@sanofi.com)**